

BIOGAN®

Reg. ICA: 6582-MV

COMPOSICIÓN

Cada mL de SOLUCIÓN INYECTABLE contiene:

Boldenona undecilenato 50 mg

USO EN:

DESCRIPCIÓN: Anabólico de acción prolongada a base de boldenona undecilenato 50 mg.

ACCIÓN

- Competitivo de la acción androgénica de la testosterona.
- Acelera todos los procesos de anabolismo celular que tienen que ver con la elaboración de proteína, aumento del metabolismo del nitrógeno mejorando la síntesis de proteínas (aumento de la masa muscular), aumenta la retención de iones de Ca y P, lo que permite un mejor desarrollo del sistema óseo del animal.

VENTAJAS

- Mejora el aprovechamiento de nutrientes, llevando a un acortamiento de los periodos de ceba.
- Colabora en todos los procesos de recuperación del animal después de cirugías del sistema óseo.
- Es un anabólico de larga acción, 30 días, lo que favorece una sola aplicación para acelerar el metabolismo animal durante ese periodo.
- Por ser generador de masa muscular, el peso alcanzado por el animal no se pierde en el proceso de faenado.
- Mejora recuperación de animales que vengan de enfermedades carenciales y estrés prolongados.

INDICACIONES

En **bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos** y como anabólico, coadyuvante en la convalecencia de enfermedades infecciosas o parasitarias, consolidación de fracturas, pérdida de peso o raquitismo. Adicionalmente:

- Mejora ganancia de peso y conversión alimenticia del animal.
- En tratamientos posquirúrgicos para regeneración del tejido óseo.
- Tratamiento de apoyo luego de enfermedades largas, estados de estrés prolongados, pacientes seniles que hayan tenido atrofia muscular.
- Hembras de descarte para cebarlas y llevarlas al matadero.

DOSIS: I.M. 1 mL/90 Kg.

Repetir cada 30 días, ideal cada 45 días.

Caninos: 1 mL/20 Kg.

PRECAUCIONES:

- Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 30 días después de finalizado el tratamiento.
- No administrar en **bovinos** en producción de leche para el consumo humano.
- No utilizarlo en hembras gestantes.
- En animales jóvenes puede presentarse osificación prematura.
- No administrar en animales que presenten tumores andrógeno-dependientes.

PRESENTACIONES: 10 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

BIOSTAR PHARMACEUTICAL S. A.