

BIOMASTIN LACTACIÓN®

Reg. ICA: 6967-MV

COMPOSICIÓN

Cada 10 mL de SOLUCIÓN contiene:

Cloxacilina sódica 200 mg
Ampicilina sódica 75 mg
Betametasona..... 4 mg
Excipientes c.s.p..... 10 mL

USO EN:

DESCRIPCIÓN: Antimastítico para vacas en lactancia. Compuesto por ampicilina sódica 75 mg, cloxacilina sódica 200 mg y betametasona 4 mg.

ACCIÓN

Ampicilina y cloxacilina: Penicilinas semisintéticas que atacan la pared celular bacteriana, destruyendo los sitios de unión celular. Esto hace que haya fuga de líquidos desde y hacia fuera de la célula (pérdida de unidad celular) y la bacteria muera. Estas dos penicilinas trabajan muy bien, tienen sinergia y un amplio espectro, ya que atacan las bacterias productoras de un 92% a 95% de la mastitis: *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Staphylococcus aureus*, y *Escherichia coli*.

Betametasona: Antiinflamatorio corticoide, disminuye la inflamación localizada a nivel de glándula mamaria y permite una rápida difusión del antibiótico.

VENTAJAS

- Combinación antibacterial de reciente uso en mastitis clínica, por ende las bacterias tienen menos resistencia y hay una acción más rápida del producto.
- Tiene antibacterianos que atacan en forma específica bacterias productoras de mastitis. Eficaz en el control de *Escherichia coli*.
- Tiene el antiinflamatorio más potente que hay en el mercado.
- Hay mayor recuperación y menor pérdida de leche, evita que se contaminen las demás vacas.
- Evita que el tejido de la ubre se vuelva fibroso.

INDICACIONES: Mastitis clínicas y subclínicas en vacas de producción.

DOSIS: 1 jeringa después de cada ordeño por 2 días si es leve y por 4 días si es grave.

Si la inflamación es muy grande, se recomienda aplicar FAINEX 10%® (Ketoprofeno).

PRESENTACIÓN: Jeringa por 10 mL.

BIOSTAR PHARMACEUTICAL S. A.