

FAINEX 10%®

Antiinflamatorio

Reg. ICA: 6690-MV

COMPOSICIÓN

Cada mL de SOLUCIÓN INYECTABLE contiene

Ketoprofeno 100 mg

Vehículo c.s.p 1 mL

USO EN:

DESCRIPCIÓN: Antiinflamatorio no esterooidal perteneciente al grupo de fármacos triple A (antiinflamatorio, analgésico y antipirético). Antiinflamatorio selectivo.

Compuesto por: Ketoprofeno 100 mg.

ACCIÓN: Ataca la vía ciclooxigenasa del proceso inflamatorio, controlando la liberación de prostanoídes, que son los mediadores de las prostaglandinas, las cuales producen inflamación, dolor y fiebre.

VENTAJAS

- Alivio inmediato de los síntomas que acompañan una infección. Esto hace que los animales estén dispuestos para recibir el tratamiento y permite que el animal se recupere porque quita el malestar y por ende va a comer, beber agua, moverse, etc.
- La potencia analgésica del ketoprofeno es superior a la del resto de antiinflamatorios no esteroídes "AINES".
- Como es inyectable se distribuye en todos los tejidos.
- Tiene menos efectos de toxicidad renal y de lesiones en la mucosa gástrica que los corticoides.
- Se puede usar en hembras gestantes.
- No deja residuos en la leche.

INDICACIONES

En **bovinos, ovinos, porcinos, caninos y gatos** como antiinflamatorio, antipirético y analgésico en afecciones músculo esqueléticas.

- Enfermedades infecciosas virales, parasitarias, traumáticas o por agentes químicos que vengán acompañados por dolor, inflamación y fiebre.
- Traumatismos, lesiones musculares, mastitis, metritis, cólicos, síndrome MMA (metritis, mastitis, agalactia) en **cerdos**.

DOSIFICACIÓN: I.M. e I.V.

Bovinos y porcinos: 1 mL/33 Kg.

Equinos: 1 mL/45 Kg.

Caninos: 0.2 mL/10 Kg.

Dependiendo de la respuesta del animal de 3 a 5 días. Dividir la dosis a la mitad y aplicar una IM o IV y la otra subcutánea.

PRECAUCIONES

- No suministrar en hembras gestantes por periodos superiores a 5 días por una baja en la perfusión renal del feto en desarrollo.
- Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 4 días después de finalizado el tratamiento.
- En caso de enfermedades infecciosas debe ir acompañado de la terapia antimicrobiana adecuada.

PRESENTACIONES: 10 mL, 50 mL y 100 mL.

BIOSTAR PHARMACEUTICAL S. A.