

## **FIPROSTAR® SPOT ON**

*Solución Tópica*

**Antiparasitario externo**

**Reg. ICA 8504 - M.V.**

**COMPOSICIÓN:** Cada mL de SOLUCIÓN contiene:

Fipronil ..... 100 mg

Excipientes c.s.p..... 1 mL

**USO EN:**

**DESCRIPCIÓN:** FIPROSTAR® SPOT ON es un compuesto fenilpirazólico usado como agente antiparasitario externo, para el control de pulgas, piojos, ácaros y garrapatas en **perros** y **gatos**.

**MECANISMO DE ACCIÓN:** FIPROSTAR® SPOT ON se une a los receptores del GABA en el sistema nervioso de los artrópodos inhibiendo el flujo iones cloro al interior de las células nerviosas, lo que conduce al parásito a un estado de hiperexcitación que causa posteriormente su muerte.

**FARMACOCINÉTICA:** El Fipronil se caracteriza por su excelente distribución por el pelo del animal tratado, a partir del sitio de aplicación focal, hacia la parte superior del cuello, ambos flancos y la zona lumbar, luego del segundo día del tratamiento, gracias especialmente a su característica lipofílica, que permite su excelente difusión por la grasa de la piel. La importante permanencia del producto, es consecuencia del fenómeno de concentración que sufre en las glándulas sebáceas, las cuales cumplen una función de reservorio.

**INDICACIONES:** FIPROSTAR® SPOT ON está indicado para el tratamiento y control de las ectoparasitosis de los **perros** y **gatos**, causadas por pulgas (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*), garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes scapularis*, *Ixodis ricinus*, *Dermacentor variabilis*) y piojos (*Trichodectes* sp., *Otodectes cynotis*, *Felicola* sp.).

Coadyuvante en el tratamiento de infestaciones por ácaros: (*Sarcoptes scabiei* var. *Canis*, *Cheyletiella* sp.)

Coadyuvante en el control de la dermatitis alérgica por pulgas (DAPP) en **perros**.

Además de poseer un rápido efecto letal en las formas adultas de estos ectoparásitos, tiene un prolongado efecto residual, capaz de mantener a los **perros** libres de pulgas por 2 a 3 meses y de garrapatas hasta 30 días.

FIPROSTAR® SPOT ON se puede considerar un importante auxiliar en el control de las infestaciones por céstodos (*Dipylidium caninum*) que parasitan a **perros** y **gatos**, ya que las pulgas son huéspedes intermediarios de éstos parásitos. Por otro lado la garrapata de los **perros** (*Rhipicephalus sanguineus*) es responsable de la transmisión de la babesiosis y de la erlichiosis canina, causadas por la *Babesia canis* y *Erlichia canis* respectivamente, siendo esencial el combate de la garrapata para el control de estas patologías.

**VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:** Uso externo, mediante aplicación tópica en un solo sitio en el dorso.

**DOSIS:** Aplicar 0,8 mL / 10 Kg de peso del animal, es decir 7,5 mg a 15 mg de Fipronil por kilogramo de peso vivo. En **perros** y **gatos** efectuar el tratamiento de acuerdo a la siguiente tabla:

Peso del animal	Dosis
Gatos de cualquier peso.	Un frasco aplicador de 0,50 mL por <b>gato</b> .
De 2 a 10 Kg de peso.	Un frasco aplicador de 0,67 mL por <b>perro</b> .
De 10 a 20 Kg de peso.	Un frasco aplicador de 1,34 mL por <b>perro</b> .
De 20 a 40 Kg de peso.	Un frasco aplicador de 2,68 mL por <b>perro</b> .
De 40 a 60 Kg de peso.	Un frasco aplicador de 4,02 mL por <b>perro</b> .

En la práctica un mL corresponde a 30 gotas de FIPROSTAR® SPOT ON, es decir se recomienda 5 gotas de producto por cada 2 kilogramos de peso.

**TRATAMIENTO:** FIPROSTAR® SPOT ON es de uso externo, para aplicación directa sobre la piel. Abrir el frasco y aplicar el contenido del envase de acuerdo al peso del animal directamente sobre la piel seca del animal, en la región de la nuca o de la cruz. El intervalo entre aplicaciones deberá ser de dos a tres meses para el tratamiento y prevención de la infestación por pulgas y de 30 días para el tratamiento y prevención de la infestación por garrapatas. FIPROSTAR® SPOT ON podrá ser aplicado a intervalos más cortos, si el animal estuviese en ambientes muy infestados o si padece de dermatitis alérgica a la picadura de pulgas, siempre a criterio del médico veterinario.

La dosis, la frecuencia y duración del tratamiento, sin embargo, depende del criterio del Médico Veterinario.

**PRECAUCIONES:**

- No administrar a **perros** ni **gatos** menores de 10 semanas de edad.
- Aplicar el producto en áreas donde el animal no pueda lamerse y que los animales no se lamen unos a otros después del tratamiento.
- Los animales no deben bañarse en los días siguientes a la aplicación del tratamiento.

En caso de ingestión beber grandes cantidades de agua. No hay antídoto específico; el tratamiento debe ser sintomático. En caso de exposición accidental al producto lávese con abundante agua durante 15 minutos.

En caso de intoxicación, llame al Médico inmediatamente o lleve al paciente al Médico y muéstrelle el empaque. No reutilice el envase y haga una disposición final del mismo de acuerdo a las normas legales vigentes.

En caso de intoxicación animal llame al Médico Veterinario.

Consérvese en sitio fresco, seco y protegido de la luz.

El fabricante garantiza que las características físicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta que mediante el registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo con las indicaciones de empleo.

**PRESENTACIONES:** Aplicador por 0,5 mL – Caja x 24 Unidades. Aplicador por 0,67 mL – Caja x 24 Unidades. Aplicador por 1,34 mL – Caja x 24 Unidades. Aplicador por 2,68 mL – Caja x 24 Unidades. Aplicador por 4,02 mL – Caja x 24 Unidades.

**Categoría toxicológica: III**

**MEDIANAMENTE TÓXICO**

**BIOSTAR PHARMACEUTICAL S. A.**