

DECTOPLUS ONYX

Doramectina 3.5%

Reg. ICA: 11242-MV

COMPOSICIÓN

Cada mL de SOLUCIÓN INYECTABLE contiene:

Doramectina..... 35 mg

Excipientes c.s.p 1 mL

DESCRIPCIÓN: DECTOPLUS ONYX Es una solución inyectable endectocida para el control de parásitos internos (nematodos) y parásitos externos (Garrapatas, nuca, ácaros) en bovinos. Ayuda en el control ambiental de larva de mosca *Haematobia irritans*, contribuyendo a disminuir la población de mosca del ganado en las fincas. Su amplio margen de seguridad permite el uso en bovinos desde el nacimiento y en hembras preñadas.

ACCIÓN:

Como ectoparasiticida, además de actuar contra todos los ácaros de la sarna en bovinos, DECTOPLUS ONYX está recomendado como garrapaticida y posee además una indicación de ayuda al control de la mosca de los cuernos.

Su acción se localiza a nivel de las terminaciones nerviosas propiamente dichas o en la zona de contacto entre una fibra nerviosa y una fibra muscular.

La doramectina se fija a los receptores que aumentan la permeabilidad de las membranas al ion cloruro, estimulando la liberación masiva a este nivel, de un compuesto químico el Ácido Gamma Aminobutírico o GABA, el cual cumple con la función de neurotransmisor.

VENTAJAS

- Control de parásitos internos y externos.
- Control de nuca durante 90 días al 96%.
- Control de garrapata durante 90 días al 86%.
- Contribuye al bienestar animal por vehículo de menor irritación y dolor en el sitio de aplicación.
- Contribuye al bienestar animal por vehículo de menor irritación y dolor en el sitio de aplicación.
- Seguro en hembras preñadas y terneros recién nacidos.

INDICACIONES

- Dectoplus Onyx está indicado en Bovinos para el tratamiento y control de endoparásitos y ectoparásitos en el ganado.
- Gusanos redondos (adultos y algunas larvas de estadio 4) : *Ostertagia ostertagi* (incluidas las larvas inhibidas), *O. lyrata*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *T. colubriformis*, *T. longispicularis*, *Cooperia oncophora*, *C. pectinata*, *C. punctata*, *C. surnabada* (sin. *mcmasteri*), *Cooperia spatulata*, *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Bunostomum phlebotomum*, *Strongyloides papillosus*, *Oesophagostomum radiatum*, *Trichuris* spp. *Mecistocirrus digitatus*.
- Gusanos pulmonares (adultos y larvas de cuarto estadio) *Dictyocaulus viviparus*.
- Gu Miasis: (estadios parasitarios), *Hypoderma bovis*, *H. lineatum*, *Dermatobia hominis*. sanos oculares (adultos), *Thelazia* spp.
- Piojos: *Haematopinus eurysternus*, *Linognathus vituli*, *Solenopotes capillatus*; y Ácaros de la sarna: *Psoroptes bovis*, *Sarcoptes scabiei*.
- Garrapatas: Coadyuvante en el control de garrapatas de un solo huésped: *Rhipicephalus microplus*.

DOSIFICACIÓN: S.C.

- Dosis farmacológica: 700 mcg/Kg de peso vivo.
- Dosis práctica: 1 mL/50 Kg de peso vivo vía subcutánea.
- Tiempo entre dosis y duración del tratamiento: Se recomienda el uso de Dectoplus Onyx en el marco de un plan de desparasitación estratégico diseñado por un Médico Veterinario para un predio en particular, de acuerdo a condiciones geográficas y de las dinámicas de población de parásitos, tanto internos como externos. Usualmente se utiliza una única dosis. La frecuencia de aplicación, queda a criterio del Médico Veterinario.
- Modo de uso: Dectoplus Onyx debe aplicarse vía subcutánea con aguja calibre 16.

PRECAUCIONES:

- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- La Doramectina no es bien tolerada por algunas especies animales para las que no está autorizada, se han observado casos graves de intolerancia con resultado de muerte en perros, especialmente en collies, perros pastores ingleses, otras razas semejantes y sus cruces, así como en tortugas.
- Eliminar envases vacíos o con contenido residual, lejos de ríos, lagos, afluentes o fuentes de agua.

PRESENTACIONES: Frasco Frasco de vidrio con caja plegadiza x 20ml y frasco de vidrio con portainyectable plástico de 50ml, 100ml, 250ml, 500ml y 600ml.

BIOSTAR PHARMACEUTICAL S. A.

