
STARZEN® INYECTABLE

Endoparasitícida

Reg. ICA: 11538-MV

COMPOSICIÓN:

Cada mL de SOLUCIÓN INYECTABLE contiene:

Ricobendazol 178,5 mg

Excipientes c.s.p 1 mL

USO EN: Bovinos.

DESCRIPCIÓN: STARZEN® INYECTABLE es un endoparasitícida de amplio espectro para control de nemátodos intestinales, pulmonares y tremátodos (Fasciola hepática) con efecto en adultos, larvas y huevos.

ACCIÓN: El ricobendazol (sulfóxido de albendazol) es un antiparasitario de amplio espectro que actúa principalmente inhibiendo la polimerización de la tubulina en los microtúbulos del parásito, lo que bloquea su capacidad de absorción de nutrientes. También interrumpe el metabolismo energético al inhibir la enzima fumarato reductasa, provocando la muerte lenta y eliminación del parásito.

VENTAJAS:

- Endoparasitícida de amplio espectro.
- Control de adultos, larvas y huevos de nemátodos.
- Control de fase adulta de fasciola hepática
- Amigable con cucarrón estercolero.
- Amplio margen de seguridad.

INDICACIONES:

En bovinos para el control y tratamiento del parasitismo ocasionado por Nemátodos Gastrointestinales: Trichostrongylus sp., Haemonchus sp., Cooperia sp., Ostertagia sp., Oesophagostomum sp., Bunostomum phlebotomum, Strongyloides sp., Nematodirus sp. Nemátodos pulmonares: Dictyocaulus sp. Tremátodos: Fasciola hepática (adultos).

DOSIFICACIÓN: En bovinos se recomienda la aplicación de 1 ml por cada 50 Kg de peso, en los casos donde se requiera tratamiento para Fasciola hepática adulta se debe aplicar 1 ml por cada 25 Kg de peso. Aplicar únicamente vía subcutánea.

PRECAUCIONES:

— No administrar dosis superiores a 10 mL en el mismo punto de aplicación, en caso que se requieran dosis mayores se recomienda dividir la misma en 2 sitios de inyección, con el fin de atenuar las reacciones en el sitio de inyección. Se recomienda utilizar agujas cortas calibre 16 para una mejor y más rápida aplicación. No aplicar a animales que presenten hipersensibilidad al principio activo.

Se puede presentar una inflamación local moderada que desaparece por sí sola 7 días postaplicación.

No utilizar en el primer tercio de la gestación.

Tiempo de retiro en carne de 28 días y en leche de 72 horas.

PRESENTACIÓN:

Frasco 500 mL.

BIOSTAR PHARMACEUTICAL S. A.